

MRSA

Portugal e Europa

Resistência à meticilina nos isolados invasivos de *Staphylococcus aureus* (MRSA), em Portugal

Despacho
2013

Norma
MRSA





Figure 3.22. *Staphylococcus aureus*. Percentage (%) of Invasive Isolates with resistance to meticillin (MRSA), by country, EU/EEA countries, 2015



Descida significativa em 7 países: Bélgica, França, Alemanha, Polónia, **Portugal** e Reino Unido



Antimicrobial resistance surveillance in Europe

Annual report of the European Antimicrobial
Resistance Surveillance Network (EARS-Net)

2015


- Proporção de MRSA a estabilizar ou decrescer na maioria dos países europeus (a menor desde 2009);
- No entanto, MRSA continua a ser uma ameaça a nível de saúde pública, uma vez que a sua proporção é >25% em sete dos 28 países (maioritariamente nos países do Sul e Este).
- “In order to further reduce the spread of MRSA in Europe, comprehensive MRSA strategies targeting all healthcare sectors (acute, long-term care facilities and ambulatory care) remain essential.” (2015)

Consumo de Antibióticos e resistências


Consumo de antibióticos em Portugal

(DDD/1000 hab/dia = DHD)

Ambulatório (93%)



Hospital (7%)



A inclusão dos subsistemas no SNS teve início em Abril de 2013


Consumo de Quinolonas em Portugal

Ambulatório


Ano	DHD
2011	2,91
2012	2,61
2013	2,18
2014	2,12
2015	2,05

 **30%**

Hospitalar



Resistência à meticilina nos isolados invasivos de *Staphylococcus aureus* (MRSA), em Portugal





DGS desde
1899

Direção-Geral da Saúde



Programa de Prevenção
e Controlo de Infeções
e de Resistência aos Antimicrobianos



Obrigado

www.dgs.pt